



CONFIDOR® 350 SC

קונפידור®

350 תרכיז רחף

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים מוצצים במגוון גידולים
 כמיל: 350 גרם/ליטר Imidacloprid, היתר חומרי דילול והרטבה



כללי: קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת ה"כלורוניקוטיניל" המיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.

אופן היישום:

מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול
-	הגמעה תבוצע במהלך השליש השני של ההשקיה. אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	פרחים וצמחי נוי* חרצית, גרברה, רוניקה, הביסקוס, ורדים, לימונים יפני, סולידסטר, סולדגו, חלבוב הדור, ליזאנטוס, גיבסנית, אגרטום.
		40 סמ"ק/ד'	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפרסק, כנימת הספיראה	
	-	3 סמ"ק/צמח	צרעת עפצים	פרח שעווה
-	טבילת הפקעות לאחר איסוף בתמיסה בעלת ריכוז של 0.05% במשך 10 דקות.	0.05%	זבוב הנרקיס קטן וגדול	נרקיס
30	יישום ע"י ריסוס והשקיה לאחר מכן.	30 סמ"ק/ד'	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת האפון, כנימת הדלועיים	תפוח אדמה
14	בהגמעה בתקופת הפריחה.	50 סמ"ק/ד'	כנימות עלה הדלועיים וכנימת אפרסק	תות שדה
30	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ- 2 טיפולים בעונה. ** מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחסוי אבטיח: בשטח גלוי בלבד.	40 סמ"ק/ד'	כנימות עלה הדלועיים	מלון, אבטיח
3		100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	מלפפון, קישוא

מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול
3	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקייה. לא יותר מ- 2 טיפולים בעונה.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	עגבניות, פלפל
		40 סמ"ק/ד'	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים	
14	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקייה.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	תבלינים: שמיר, מיורם, פטרזיליה, חומעה, מרווה, טרגון, קורנית, אורגנו, רוזמרין, בצל ירוק עירית, כוסברה, בזיל, מנטה
		40 סמ"ק/ד'	כנימת הדלועיים	
14	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקייה.	100 סמ"ק/ דונם	כנימת עש הטבק	רוקולה
28		40 סמ"ק/ דונם	כנימת הדלועיים	
--	יישום דרך מערכת טיפוטון במהלך השליש השני של ההשקייה במערכות מנותקות.	100 סמ"ק/ד'	כנימת עש הטבק	כותנה
		40 סמ"ק/ד'	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפון, כנימת הקטניות	
30	יישום דרך מערכת טיפוטון במהלך השליש השני של ההשקייה במערכות מנותקות.	40 סמ"ק/ד'	כנימת עלה התירס	תירס מתוק
30	ריסוס עד נגירה	0.05%	ציקדה ירוקה	אפרסק, שקד, שזיף***
	לשתיל במשתלה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקייה.	1 סמ"ק/עץ		
	המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקייה רגילה.	2-10 סמ"ק/ עץ		
30	בהגמעה בשליש השני של השקייה רגילה בסתיו או באביב.	10 סמ"ק / עץ	כנימה אדומה'	זית***

מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול
30	טיפול אחד בעונה. במידה ויש היסטוריה של כנימה קימחית כדורית בפרדס יש להתחיל את הטיפול מוקדם בעונה (מיד לאחר הפריחה), אחרת עם תחילת הופעת המזיק בגזעים. יישום ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	10 סמ"ק / עץ	כנימה קימחית כדורית	הדרים***
	טיפול אחד בעונה. פרדס עם היסטוריה של נגיעות בכנימה אדומה יש ליישם את התכשיר מאמצע חודש אפריל ועד אמצע חודש מאי (לאחר הפריחה). יישום ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.		כנימה אדומה	
	במשתלות הדרים. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	1 סמ"ק/עץ	עש מנהרות ההדר	
	לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	2-3 סמ"ק/ עץ		
	לעצים בוגרים בפרדס המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	4-10 סמ"ק/ עץ		
30	ריסוס עד נגירה.	0.05%	כנימות עלה: כנימת התפוח הירוקה, כנימת הדלועיים, כנימת הספיראה	תפוח***
	לשתיל במשתלה בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	1 סמ"ק/עץ 2-10 סמ"ק/ עץ		
	לעצים בוגרים במטע בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הליבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של השקיה רגילה.	10 סמ"ק/עץ	כנימת הדם	
	לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המינון בהתאם לגודל העץ.	1-5 סמ"ק/ עץ	ליטוקולטיס	
30	בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה עם תחילת הליבלוב.	5-10 סמ"ק / עץ	אפנוסטיגמה	אגס***

מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות ושיטות היישום	מינון	מזיק	הגידול
5 חודשים	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה בסתיו או באביב.	10 סמ"ק / עץ	כנימת שעווה פלורידית	אפרסמון ***
3	בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה עם תחילת הליבלוב. רמת המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	1-2 סמ"ק / גפן	כנימה קימחית הגפן	גפן
		0.3-0.5 סמ"ק/גפן	ציקדות	
40	ריסוס עד נגירה	0.05%	כנימת הפקאן הצהובה	פקאן ***
	בהגמעה ליד טפטפות או מתזים ואח"כ יש לבצע השקית החדרה	15 סמ"ק לעץ בוגר		
14	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה בסתיו או באביב.	5 סמ"ק / עץ	ציקדת הדבש	תמר ***
30	הגמעה פעם בחודש במשך 3 חודשים עוקבים	10 סמ"ק / עץ	חדקונית הדקל האדומה	
-	נפח תרסיס 15 ליטר. זילוף לאיזור הלולב	0.12%	חדקונית הדקל האדומה	דקל קנרי
7	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה רגילה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע. בהתאם להנחיות המדריך האיזורי.	100 סמ"ק / דונם	כנימת הפנטלוניה	בננה ***
14 ימים	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה.	100 סמ"ק לדונם	כנימת עלה, כנימת עש הטבק	גידולי עלים - מיזונה, תרד, עלי סלק אדום (בולס בלד ורדצ'ארד), עלי טט-סוי

הערות: 1 - התכשיר מדביר את שלבי ההתפתחות הצעירים של המזיק ומונע את התבססותו בעלווה ובפרי. התכשיר אינו מדביר מזיק הנמצא על גבי הפרי בעת יישום התכשיר.
2 - המינון מיועד לעצים מניבים בפרדס החל מגיל 3 שנים. בעצים לאחר החלפת זן, החל מ-3 שנים לאחר החלפת הזן ניתן לטפל במידה ועצים אלו בעלי התפתחות יפה ומגיעים לגובה של 2.5 - 3 מטר.



***פרחים וצמחי נוי:**

חרצית, גרברה, רוניקה, היביסקוס, ורדים, לימוניום יפני, סולידסטר, סולידגו, חלבולב הדור, ליזאנטוס, גיפסנית, אגרטום. בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים. אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

****דלועים שקיבלו טיפול זרעים בגאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.**

*****פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה.**

שטח המיועד לטיפול הגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

שילובים: מומלץ לא לשלב את התכשיר עם תכשירים אחרים.

סכנות לסביבה:

מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה מימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
התכשיר רעיל מאד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להמנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.
בשטח מטופל בקונפידור יש להכניס את הדבורים לאחר שבועיים מיום הטיפול.



דרגת רעילות: (III) מסוכן לבריאות
מס' או"ם: לא מסווג