

אנוידור®

240 תרכיז רחיף

Envidor® 240 SC
SC 240



מכיל: 240 גר/ל' Spirodiclofen

קוטל אקריות, ציקדות וביצי פסילת האגס במטע הנשיר, פרדס ואבוקדו

כללי: אנוידור הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות טטרוניות) ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן בגוף האקרית. התכשיר קוטל את הביצים ואת כל דרגות הנימפה של אקריות הקורים (אקרית אירופית וצהובה, אקרית האבוקדו, אקרית אדומה מזרחית) וכן של אקרית החלודה של ההדר. כמו כן, לתכשיר השפעה על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולתן להטיל ביצים, תופעה הגורמת לתמותתן. התכשיר אינו פוגע באקריות בוגרות ממין זכר. על מנת למנוע התבססות של אוכלוסיית אקריות בפרדס ובמטע, יש לרסס את התכשיר רק כאשר הנגיעות באקריות נמוכה מאוד (ראה הנחיות בטבלת היישום). בנוסף מדביר התכשיר את דרגות הנימפה של הציקדה הירוקה ובכך מונע את התבססות המזיק במטע.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון	נפח תרסיס	טיפול אחרון לפני קטיף
הדרים	אקרית החלודה ¹	0.02% (אך לא פחות מ- 90 סמ"ק/ד')	200 - 500 לפי גודל עצים אובנפח עד נגירה	14 יום
	אקרית אדומה מזרחית	0.02%	במרסס רובים עד נגירה	
אבוקדו	אקרית אבוקדו	0.02%	עד נגירה	14 יום
תפוח	אקרית אירופית אקרית צהובה ²	0.04%		21 יום
אגס	ביצי פסילת האגס ³ אקרית אירופית אקרית צהובה ²	0.04%	100 - 200 ל' / ד' לפי גודל עצים	21 יום
שזיף, שקד, אפרסק, נקטרינה, גודגדן	אקרית צהובה ²	0.03%	עד נגירה	ראה תווית
	ציקדה ירוקה (דרגות צעירות בלבד)	0.04%		

הערות:

- יש לרסס בנגיעות נמוכה מ- 2 אקריות בממוצע לשדה זכוכית מגדלת בעלת הגדלה של פי 10 ושטח ראייה של 2.25 סמ"ר.
- יש לרסס בנגיעות נמוכה מ- 0.5 אקרית בממוצע (צהובה ו/או אירופית) לעלה.
- יש ליישם את התכשיר בדור החורפי של פסילת האגס ולשלב עם קוטל בוגרים (טלסטאר).

שילובים: בתפוח: ניתן לשלב אנוידור עם פרופאל, קליפסו, פלינט, באיפידן, בהתאם להמלצות הרשומות בתווית התכשיר. כל שילוב אחר אין לבצע.
באגס: ניתן לשלב אנוידור עם טלסטאר 50 ת.מ. בהתאם להמלצות הרשומות בתווית התכשיר. כל שילוב אחר אין לבצע.

סכנות לסביבה: התכשיר אינו רעיל לדבורים בוגרות, אך עלול להשפיע על התפתחות הוולדות.

סיווג: (IV) מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג
תכולה: 0.5 ליטר, 1 ליטר